

## 環境基礎解析学I 第13回問題 解答

1. 次の定積分・広義積分を計算せよ。 $k$  は正の定数。

$$(1) \int_0^{\infty} e^{-kx} dx$$

$-kx = t$  とおく。両辺  $x$  で微分すると  $-k = \frac{dt}{dx}$ , この両辺に  $\frac{dx}{-k}$  をかけて  $dx = -\frac{dt}{k}$ 。この2式で  $-kx$  と  $dx$  の置き換えを行うと「 $t$  の関数の  $dt$  による積分」になるので

$$\int e^{-kx} dx = \int e^t \left( -\frac{dt}{k} \right) = -\frac{1}{k} \int e^t dt = -\frac{1}{k} e^t = -\frac{1}{k} e^{-kx}$$

が得られる。(これが不定積分の置換積分法である。) このようにして得られた原始関数  $-\frac{1}{k} e^{-kx}$  を使って広義積分を計算すると

$$\int_0^{\infty} e^{-kx} dx = \left[ -\frac{1}{k} e^{-kx} \right]_0^{\infty} = \left( -\frac{1}{k} e^{-\infty} \right) - \left( -\frac{1}{k} e^0 \right) = \frac{1}{k}$$

$$(2) \int_0^{\infty} x e^{-kx} dx$$

(1) より

$$\int e^{-kx} dx = -\frac{1}{k} e^{-kx}$$

だから

$$\left( -\frac{1}{k} e^{-kx} \right)' = e^{-kx}$$

である。これと不定積分の部分積分法

$$\int (f(x))' g(x) dx = f(x)g(x) - \int f(x)(g(x))' dx$$

を利用して

$$\begin{aligned}
\int x e^{-kx} dx &= \int \left( -\frac{e^{-kx}}{k} \right)' \times x dx \\
&= \left( -\frac{e^{-kx}}{k} \right) \times x - \int \left( -\frac{e^{-kx}}{k} \right) \times (x)' dx \\
&= \frac{-x e^{-kx}}{k} + \int \frac{e^{-kx}}{k} dx
\end{aligned}$$

ここで再び (1) より

$$\begin{aligned}
&= \frac{-x e^{-kx}}{k} + \frac{1}{k} \left( -\frac{e^{-kx}}{k} \right) \\
&= \frac{-(kx + 1)e^{-kx}}{k^2}.
\end{aligned}$$

これで原始関数  $\frac{-(kx + 1)e^{-kx}}{k^2}$  がえられたが、これを利用して広義積分を計算すると

$$\begin{aligned}
&\int_0^{\infty} x e^{-kx} dx \\
&= \left[ \frac{-(kx + 1)e^{-kx}}{k^2} \right]_0^{\infty} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-(kx + 1)e^{-kx}}{k^2} - \frac{-e^0}{k^2} = \frac{1}{k^2}
\end{aligned}$$

が得られる。

(別解) 広義積分の場合でも (もし積分が収束するならば), いま述べたように 2 段階ではなく, 以下に示すようにいきなり部分積分法を使うことができる。

$$\begin{aligned}
&\int_0^{\infty} x e^{-kx} dx \\
&= \int_0^{\infty} \left( -\frac{e^{-kx}}{k} \right)' \times x dx \\
&= \left[ \left( -\frac{1}{k} e^{-kx} \right) \times x \right]_0^{\infty} - \int_0^{\infty} \left( -\frac{1}{k} e^{-kx} \right) \times 1 dx \\
&= \left[ \left( -\frac{1}{k} e^{-kx} \right) \times x \right]_0^{\infty} - \left[ \left( -\frac{1}{k} \right)^2 e^{-kx} \right]_0^{\infty} \\
&= \lim_{x \rightarrow \infty} \left( -\frac{1}{k} e^{-kx} \times x \right) - \left( -\frac{1}{k} e^0 \times 0 \right) - \left( -\frac{1}{k^2} e^{-\infty} \right) + \left( \frac{1}{k^2} e^0 \right)
\end{aligned}$$

$$= \frac{1}{k^2}$$

ここで  $e^{-\infty} = 0$ ,  $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^n}{e^{kx}} = 0$ ,  $k > 0, n = 0, 1, 2, \dots$  を使った。教科書 112 ページを見よ。

$$(3) \int_{-\frac{1}{2}}^4 \frac{dx}{\sqrt{2x+1}}$$

積分される関数が  $x = -\frac{1}{2}$  で定義できないから広義積分であることに注意せよ。

$2x+1 = t$  とおく。両辺  $x$  で微分すると  $2 = \frac{dt}{dx}$ , この両辺に  $\frac{dx}{2}$  をかけて  $dx = \frac{dt}{2}$ 。この2式で  $2x+1$  と  $dx$  の置き換えを行うと

$$\int \frac{dx}{\sqrt{2x+1}} = \int \frac{1}{\sqrt{t}} \frac{dt}{2} = \frac{1}{2} \int t^{-\frac{1}{2}} dt = \frac{1}{2} \frac{t^{-\frac{1}{2}+1}}{-\frac{1}{2}+1} = \sqrt{t} = \sqrt{2x+1}$$

だから 原始関数  $\sqrt{2x+1}$  が得られるのでこれを使って

$$\int_{-\frac{1}{2}}^4 \frac{dx}{\sqrt{2x+1}} = \left[ \sqrt{2x+1} \right]_{-\frac{1}{2}}^4 = \sqrt{2 \times 4 + 1} - \sqrt{0} = 3$$

である。しかし

$$\int_{-\frac{1}{2}}^4 \frac{dx}{\sqrt{2x+1}} = \int_{-\frac{1}{2}}^4 \frac{1}{\sqrt{t}} \frac{dt}{2} = \left[ \sqrt{t} \right]_{-\frac{1}{2}}^4 \text{ は誤り。}$$

$x = -\frac{1}{2}$  のとき  $t = 0$ ,  $x = 4$  のとき  $t = 9$

だから

$$\int_{-\frac{1}{2}}^4 \frac{dx}{\sqrt{2x+1}} = \int_0^9 \frac{1}{\sqrt{t}} \frac{dt}{2} = \left[ \sqrt{t} \right]_0^9 = \sqrt{9} - \sqrt{0} = 3$$

が正しい。

$$(4) \int_0^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$$

$x = \tan t, 0 < t < \frac{\pi}{2}$  とおくと

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{\cos^2 t} \text{ だから } dx = \frac{dt}{\cos^2 t},$$
$$\frac{1}{1 + \tan^2 t} = \cos^2 t, \text{ (三平方の定理)}$$

$$x = 0 \Rightarrow t = 0, x \rightarrow \infty \Rightarrow t \rightarrow \frac{\pi}{2}$$


に注意すると

$$\int_0^\infty \frac{dx}{1+x^2} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 dt = \frac{\pi}{2}$$

(別解)  $(\tan^{-1} x)' = \frac{1}{1+x^2}$  だから

$$\int_0^\infty \frac{dx}{1+x^2} = [\tan^{-1} x]_0^\infty = \tan^{-1}(\infty) - \tan^{-1} 0 = \frac{\pi}{2} - 0 = \frac{\pi}{2}$$

2.



図のような図形を、点  $(x, 0)$  を通り  $x$  軸に垂直な直線で切った切り口の長さを  $l(x)$  とする. このとき図形の面積  $S$  を  $l(x)$  で表せ. 簡単でよいからそうなる説明をつけること.

右図のように  $S$  を分割し  $k$  番目の断片に着目すると, その面積は大体  $l(x_k) \times \Delta x_k$  で近似される. (ここで  $x_k$  は  $k$  番目の分点,  $\Delta x_k$  は  $k$  番目の小区間の幅である.) したがって  $S$  は

$$S \approx \sum_{k=1}^n l(x_k) \Delta x_k$$

のように近似されるが


$$\lim \sum_{k=1}^n l(x_k) \Delta x_k = \int_a^b l(x) dx \quad (\text{lim は分割を細かくする極限})$$

であり、近似の誤差は極限を取ると0に近づくことが分かっている  
ので

$$S = \int_a^b \ell(x) dx$$

である。

3. (1) 関数  $y = x^2 - 2x$ ,  $y = x$  のグラフの概形を書け。また、二つのグラフの交点の座標を求めよ。



$y = x^2 - 2x = x(x - 2)$  であるから  $x = 0$  または  $x = 2$  のとき  $y = 0$  となるので  $x$  軸との交点は  $(0, 0)$   $(2, 0)$  である。また  $y = (x - 1)^2 - 1$  だから頂点が  $(1, -1)$  の放物線である。下に凸であるのは明らか。

$y = x$  は原点をとおり傾き 1 の直線である。

交点の座標は連立方程式

$$\begin{cases} y = x^2 - 2x, \\ y = x \end{cases}$$

をといて  $(0, 0)$  と  $(3, 3)$ 。

- (2) 関数  $y = x^2 - 2x$ ,  $y = x$  のグラフで囲まれる部分の面積を計算せよ。

この部分は  $0 \leq x \leq 3$  の範囲にあり、この範囲では直線  $y = x$  が放物線  $y = x^2 - 2x$  の上方にある。

$$\int_0^3 \{x - (x^2 - 2x)\} dx = \int_0^3 \{-x^2 + 3x\} dx = \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{3}{2}x^2\right]_0^3 = \frac{9}{2}$$

4. (1) 曲線  $C: y = x^3 - 2x + 1$  の増減を調べよ。


$f(x) = x^3 - 2x + 1$  とおく。

$$f'(x) = 3x^2 - 2 = 3\left(x + \frac{\sqrt{6}}{3}\right)\left(x - \frac{\sqrt{6}}{3}\right)$$

$x < -\frac{\sqrt{6}}{3}$  のとき  $f'(x) > 0$  だから単調増加

$-\frac{\sqrt{6}}{3} < x < \frac{\sqrt{6}}{3}$  のとき  $f'(x) < 0$  だから単調減少

$\frac{\sqrt{6}}{3} < x$  のとき  $f'(x) > 0$  だから単調増加



$\frac{\sqrt{6}}{3} < \frac{\sqrt{9}}{3} = 1$  に注意。

(2)  $C$  の  $x = -1$  である点における接線  $l$  の方程式を求めよ。

$f'(-1) = 1$  だから  $l$  の傾きは 1.  $f(-1) = 2$  だから接点は  $(-1, 2)$ .

したがって  $l$  は点  $(-1, 2)$  をとおき傾き 1 の直線だから

$$y = 1(x - (-1)) + 2 = x + 3$$

(3)  $C$  と  $l$  の交点を求めよ。

交点の座標  $(x, y)$  は  $\begin{cases} y = x^3 - 2x + 1 \\ y = x + 3 \end{cases}$  の解である。

接点は  $(-1, 2)$  であるから  $x = -1, y = 2$  がひとつの解である。

$y$  を消去して

$$x + 3 = x^3 - 2x + 1 \iff x^3 - 3x - 2 = 0$$

$x = -1$  がひとつの解であるから  $x^3 - 3x - 2$  は  $x + 1$  で割り切れる。わり算を実行すると

$$x^3 - 3x - 2 = (x + 1)(x^2 - x - 2) = (x + 1)(x + 1)(x - 2)$$

だから他の解は  $x = 2$ . このとき  $y = 5$  だからもう一つの交点は  $(2, 5)$ . あわせて

$$(x, y) = (-1, 2), (2, 5)$$


(4)  $C$  と  $\ell$  で囲まれる部分の面積を求めよ。

$\ell$  のほうが上にあるから

$$\begin{aligned} \int_{-1}^2 ((x+3) - (x^3 - 2x + 1)) dx &= \int_{-1}^2 (-x^3 + 3x + 2) dx \\ &= \left[ -\frac{x^4}{4} + \frac{3}{2}x^2 + 2x \right]_{-1}^2 = \frac{27}{4} \end{aligned}$$

5. 区間  $[0, \pi]$  において、2つの曲線  $y = \sin 2x$ ,  $y = \sin x$  によって囲まれる図形の面積を求めよ。

$y = \sin 2x$  は周期  $\pi$ ,  $y = \sin x$  は周期  $2\pi$  だから図示すると



となる.

$y = \sin x$  と  $y = \sin 2x$  の交点は

連立方程式

$$\begin{cases} y = \sin x \\ y = \sin 2x \end{cases}$$

を解けば求まる.

$\sin 2x - \sin x = 0$  であるが  $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$  だから

$$\sin x(2 \cos x - 1) = 0$$

$$\sin x = 0 \text{ または } \cos x = \frac{1}{2}$$

これを満たす  $x$  の値は  $0 \leq x \leq \pi$  の範囲では  $x = 0, \frac{\pi}{3}, \pi$ .


また,  $0 \leq x \leq \frac{\pi}{3}$  の範囲では  $\sin 2x \geq \sin x$ ,  $\frac{\pi}{3} \leq x \leq \pi$  の範囲では  $\sin 2x \leq \sin x$ , したがって囲まれる部分の面積は

$$\begin{aligned} S &= \int_0^{\frac{\pi}{3}} (\sin 2x - \sin x) dx + \int_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} (\sin x - \sin 2x) dx \\ &= \left[ -\frac{1}{2} \cos 2x + \cos x \right]_0^{\frac{\pi}{3}} + \left[ \frac{1}{2} \cos 2x - \cos x \right]_{\frac{\pi}{3}}^{\pi} \\ &= \frac{1}{4} + \frac{9}{4} = \frac{5}{2} \end{aligned}$$

6. (★)  $\begin{cases} x = \cos \theta \\ y = \sin(2\theta) \end{cases} \quad \left(0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}\right)$  のようにパラメータ表示された曲線と  $x$  軸で囲まれた部分の面積を求めよ。

曲線は図のようになる。Mathematica で書いて見よ。コマンドは

`ParametricPlot[{Cos[t], Sin[2 t]}, {t, 0, Pi/2}]`



$$\ell(x) = y = \sin(2\theta), \quad dx = -\sin \theta d\theta$$

だから置換積分により

$$\text{面積} = \int_0^1 \ell(x) dx = \int_{\frac{\pi}{2}}^0 (-\sin(2\theta) \sin \theta) d\theta = \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{2}}^0 (\cos(3\theta) - \cos \theta) d\theta = \frac{2}{3}$$

$\sin A \sin B = -\frac{1}{2}(\cos(A+B) - \cos(A-B))$  を使った。