


## 建設基礎数学 B 第5回解答

1. 直線上を運動する動点 P がある. 時刻  $t$  での P の速度  $v(t)$  のグラフは図のようである.



- (1) 最も速度が大きくなる時刻はいつか

最も速度が大きくなる時刻は 縦座標が最大になる点だから  $t_2$ .

- (2) 最も出発点から遠ざかる時刻はいつか. またそのときの出発点からの距離をグラフと  $t$  軸で囲まれる図形の面積  $S_1, S_2$  を用いて表せ.

$0 < t < t_3$  では  $v(t) > 0$  だから点は右方向に運動する.  $t = t_3$  で一瞬停止して  $t_3 < t < t_5$  では  $v(t) < 0$  だから点は左方向に運動する. したがって, 最も出発点から遠ざかる時刻は 最も右へ行く時刻だから  $t = t_3$ . そのときの出発点からの距離は

$$\int_0^{t_3} v(t) dt = S_1.$$

- (3) 時刻  $t_5$  での出発点からの距離と, それまでに動いた道のりを  $S_1, S_2$  を用いて表せ.

時刻  $t_5$  での出発点からの位置の変化量は

$$\int_0^{t_5} v(t) dt = \int_0^{t_3} v(t) dt + \int_{t_3}^{t_5} v(t) dt$$

ところで  $t_3 < t < t_5$  の範囲では  $v < 0$  であるから  $\int_{t_3}^{t_5} v(t) dt = -S_2$  となるので  $= S_1 - S_2$

それまでに動いた道のりは

$$\int_0^{t_5} |v(t)| dt = \int_0^{t_3} |v(t)| dt + \int_{t_3}^{t_5} |v(t)| dt = S_1 + S_2.$$

2. 空中を自由落下する物体は地球の引力によって鉛直下向きに  $g (= 9.8[m/s^2])$  の加速度が生じる。つまり、時刻  $t[s]$  の下向きの速度を  $v(t)[m/s]$  とするとき

$$\frac{d}{dt}v(t) = g$$

である。したがって速度  $v(t)$  は  $g$  の原始関数である。従って時刻  $0[s]$  から  $t_1[s]$  までの速度の変化は、「速度と座標の変化量の関係」と同様の考え方で定積分を用いて

$$v(t_1) - v(0) = \int_0^{t_1} g dt = gt_1$$

のように求められる。(記号  $t_1$  を使ったのは積分に使われる変数  $t$  と同じ記号を使いたくなかったからです。) だから  $t_1$  を  $t$  に置き換えることにより時刻  $t$  での速度  $v(t)$  は  $v(0), g$  を用いて

$$v(t) = gt + v(0)$$

と表される。

(2) 時刻  $t_1[s]$  での物体の座標を  $y(t_1)[m]$  とすると「速度と座標変化量の関係」は

$$y(t_1) - y(0) = \int_0^{t_1} v(t) dt$$

であるから (1) の結果を使って

$$y(t_1) - y(0) = \int_0^{t_1} v(t) dt = \int_0^{t_1} (gt + v(0)) dt$$


となるが、授業中にやった「定数関数と一次関数の定積分」の結果を使えば

$$= \frac{1}{2}gt_1^2 + v(0)t_1$$

となる。だから  $t_1$  を  $t$  に置き換えることにより時刻  $t$  での座標  $y(t)$  は  $y(0), v(0), g$  を用いて

$$y(t) = \frac{1}{2}gt^2 + v(0)t + y(0)$$

と表される.



3.

(1)  $2x + 6 = t$  とおくとこの式を両辺  $x$  で微分して  $\frac{dt}{dx} = 2$  すなわち  $dx = \frac{dt}{2}$  だから

$$\int (2x + 6)^4 dx = \int t^4 \frac{dt}{2} = \frac{1}{2} \int t^4 dt = \frac{1}{2} \frac{t^5}{5} = \frac{1}{10} (2x + 6)^5$$

したがって

$$\int_{-3}^2 (2x + 6)^4 dx = \left[ \frac{1}{10} (2x + 6)^5 \right]_{-3}^2 = 10000$$

(2)  $2x + 1 = t$  とおくと  $\frac{dt}{dx} = 2$  すなわち  $dx = \frac{dt}{2}$  だから

$$\int \sqrt{2x + 1} dx = \int \sqrt{t} \frac{dt}{2} = \frac{1}{2} \int \sqrt{t} dt = \frac{1}{2} \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} = \frac{1}{3} (2x + 1)^{\frac{3}{2}},$$

したがって

$$\int_0^4 \sqrt{2x + 1} dx = \left[ \frac{1}{3} (2x + 1)^{\frac{3}{2}} \right]_0^4 = 9 - \frac{1}{3} = \frac{26}{3}$$

(3) (2) より  $\sqrt{2x+1} = \left(\frac{1}{3}(2x+1)^{\frac{3}{2}}\right)'$  だから部分積分法により

$$\begin{aligned}\int x\sqrt{2x+1} dx &= \int x \left(\frac{1}{3}(2x+1)^{\frac{3}{2}}\right)' dx \\ &= x \left(\frac{1}{3}(2x+1)^{\frac{3}{2}}\right) - \int \left(\frac{1}{3}(2x+1)^{\frac{3}{2}}\right) dx \\ &= x \left(\frac{1}{3}(2x+1)^{\frac{3}{2}}\right) - \frac{1}{3} \int (2x+1)^{\frac{3}{2}} dx\end{aligned}$$

ここで (2) と同様にして  $\int (2x+1)^{\frac{3}{2}} dx = \frac{1}{5}(2x+1)^{\frac{5}{2}}$  が分かるので

$$\begin{aligned}&= \frac{1}{3}x(2x+1)^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{15}(2x+1)^{\frac{5}{2}} \\ &= \frac{1}{15}(3x-1)(2x+1)^{\frac{3}{2}}\end{aligned}$$

または (2) と同じ変数変換で

$$\begin{aligned}\int x\sqrt{2x+1} dx &= \int \frac{t-1}{2} \sqrt{t} \frac{dt}{2} \\ &= \frac{1}{4} \int t^{\frac{3}{2}} - t^{\frac{1}{2}} dt \\ &= \frac{1}{10}(2x+1)^{\frac{5}{2}} - \frac{1}{6}(2x+1)^{\frac{3}{2}} \\ &= \frac{1}{15}(3x-1)(2x+1)^{\frac{3}{2}}\end{aligned}$$

したがって

$$\int_0^4 x\sqrt{2x+1} dx = \left[\frac{1}{15}(3x-1)(2x+1)^{\frac{3}{2}}\right]_0^4 = \frac{121}{5} - \frac{13}{3} = \frac{298}{15}$$

(4)  $\int \sin x dx = -\cos x$  だから

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \left[-\cos x\right]_0^{\frac{\pi}{2}} = -\cos \frac{\pi}{2} - (-\cos 0) = 1$$

(5)  $\int_0^{\pi} \sin x dx = \left[-\cos x\right]_0^{\pi} = -\cos \pi - (-\cos 0) = 2$

(6)  $2x = t$  とおくと  $\frac{dt}{dx} = 2$  すなわち  $dx = \frac{dt}{2}$  だから

$$\int \sin(2x) dx = \int \sin t \frac{dt}{2} = \frac{1}{2} \int \sin t dt = -\frac{1}{2} \cos t = -\frac{1}{2} \cos(2x)$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin 2x dx = \left[ -\frac{1}{2} \cos(2x) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = -\frac{1}{2} (\cos \pi - \cos 0) = 1$$

$$(7) \int_0^{\pi} \sin 2x dx = \left[ -\frac{1}{2} \cos(2x) \right]_0^{\pi} = -\frac{1}{2} (\cos 2\pi - \cos 0) = 0$$

(8)  $\int \sin 2x dx = -\frac{1}{2} \cos 2x$  であるから  $\left(-\frac{1}{2} \cos 2x\right)' = \sin 2x$  したがって

$$\begin{aligned} \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \sin 2x dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \left(-\frac{1}{2} \cos 2x\right)' dx \\ &= \left[ x \left(-\frac{1}{2} \cos 2x\right) \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} (x)' \left(-\frac{1}{2} \cos 2x\right) dx \end{aligned}$$

$$\int \cos 2x dx = \frac{1}{2} \sin 2x \text{ だから}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\pi}{2} \left(-\frac{1}{2} \cos \pi\right) + \left[\frac{1}{4} \sin 2x\right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{\pi}{4} \end{aligned}$$